

Oznac.	Nazwa strumienia	ΔT	T_{max}	λ [°]	Współrzędne radiantu		S [°]	ΔR [°/d]		v [km/s]	r	ZHR	Uwagi
					α [°]	δ [°]		$\alpha\Delta$	$\delta\Delta$				
QUA	Kwadrantydy	28 XII-12 I	3 I 15 ^h 00 ^m	283.15	230 (15.3 ^h)	+49	5	+0.8	-0.2	41	2.1	80	Obserwowany od 1835 (Szwajcaria). Nazwa pochodzi od nieistniejącego obecnie gwiazdozbioru "Kwadrant Ścienny". Okres 5.46 lat. Max. w 1943 i 1948r. Związane z planetoidą (196256) 2003 EH1
PIP	π Puppidy II (3)	6-14 I	10 I	290.7	113 (7.5 ^h)	-43	5	+0.4	-0.2	35	3.0		
DCA*	δ Cancri	1-24 I	17 I	297	130 (8.7 ^h)	+20	10/5	+0.9	-0.1	28	3.0	4	
ACR	α Crucidy	6-28 I	19 I	299.7	192 (12.8 ^h)	-63	10/5	+1.1	-0.2	50	2.9	5	
GUM	γ Ursae Minorydy	10-22 I	18 I	298	228 (15.2 ^h)	+67				31	3.0	3	
LVL	λ Velidy II (3)	18-26 I	21 I	301.7	133 (8.9 ^h)	-46	5	+0.7	-0.2	35	3.0		
CAN	α Carinidy	24 I-9 II	31 I	311.7	95 (6.3 ^h)	-54	5	2.5	2.5				
VIR*	Wirginidy 3 II 13 II 23 II 5 III 15 III 25 III 4 IV 14 IV 24 IV 4 V 14 V 24 V	25 I-15 IV	śr. 25 III	śr. 004	159 (10.6 ^h) 167 (11.1 ^h) 174 (11.6 ^h) 182 (12.1 ^h) 189 (12.6 ^h) 195 (13.0 ^h) 200 (13.3 ^h) 204 (13.6 ^h) 208 (13.9 ^h) 211 (14.1 ^h) 214 (14.3 ^h) 217 (14.5 ^h)	+15 +9 +5 +1 -2 -4 -6 -8 -9 -11 -12 -13	15/10			30	3.0	5	Bardzo silnie rozmyte i ruchomy radiant. Powolne, jasne, wyraźne, żółto-pomarańczowe meteory i bolidy. Przynajmniej częściowo związane z kometa 1834r.
TCE	θ Centaurydy	23 I-12 III	1 II	312.7	210 (14.0 ^h)	-40	6	+1.1	-0.2	60	2.6		
ACE	α Centaurydy	31 I-20 II	8 II	319.4	211 (14.1 ^h)	-58	4	+1.2	-0.3	58	2.0	6 (do 25)	
OCE	\circ Centaurydy	31 I-19 II	11 II	322.7	177 (11.8 ^h)	-56	6	+1.0	-0.3	51	2.8		
DLE	δ Leonidy	15 II- 10 III	24 II	336	168 (7.0 ^h)	+16	8	+0.9	-0.3	23	3.0	2	
GNO	γ Normidy	25 II-28 III	14 III	354	239 (15.9 ^h)	-50	5	+1.1	+0.1	56	2.4	6	
BPA	β Pavonidy	11 III-16 IV	7 IV	017.2	308 (20.5 ^h)	-63	10/15	+1.2	+0.1	59	2.6	13	
SAG*	Skorpionidy/ Sagittarydy (1) 15 IV 25 IV 5 V 15 V 25 V 4 VI 14 VI 24 VI 4 VII 14 VII	15 IV-15 VII	śr. 20 V	śr. 059	224 (14.9 ^h) 230 (15.3 ^h) 236 (15.7 ^h) 243 (16.2 ^h) 251 (16.7 ^h) 260 (17.3 ^h) 269 (17.9 ^h) 279 (18.6 ^h) 288 (19.2 ^h) 297 (19.8 ^h)	-18 -22 -25 -27 -29 -30 -30 -28 -27 -24	15/10			30	2.5	5	Związany z kometa Karoliny Herschel 1790 III oraz, być może z kometa 1853 II
LYR	Lirydy	14-30 IV	22 IV 13 ^h 30 ^m	032.32	271 (18.1 ^h)	+34	5	+1.1	0.0	49	2.1	18 (do 90)	Znane od starożytności (Chiny, 687 r. p.n.e.) Białe meteory bez śladów. Deszcze w 1803 i 1922 (ZHR=1800). Związany z kometa C/1861 G1 (Thatcher) o okresie 415 lat.
PPU	π Puppidy	15-28 IV	23 IV 19 ^h	033.5	110 (7.3 ^h)	-45	5	+0.6	-0.2	18	2.0	do 40	Związane z kometa 26P/Grigg-Skjellerup
ABO	α Bootydy	14 IV-12 V	27 IV	036.7	218 (14.5 ^h)	+19	8	+0.9	-0.1	20	3.0	3	

Oznac.	Nazwa strumienia	ΔT	T_{max}	λ [°]	Współrzędne radiantu		S [°]	ΔR [°/d]		v [km/s]	r	ZHR	Uwagi
					α [°]	δ [°]		$\alpha\Delta$	$\delta\Delta$				
ETA	η Akwarydy	19 IV-28 V	6 V 03 ^h	045.5	338 (22.5 ^h)	-1	4	+0.9	+0.4	66	2.4	50	Znane od wczesnego średniowiecza (Chiny-687 r. n.e.) Bardzo szybkie, długie meteory ze śladami. Związany z kometa 1P/Halley
ASC	α Skorpionidy (2)	26 III-12 V	3 V	043.4	240 (16.0 ^h)	-27	5	+0.9	-0.1	35	2.5	10	
ELY	η Lirydy	3-14 V	10 V	050.0	291 (19.4 ^h)	+43				43	3.0	3	Młody strumień, związany z kometa C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
NOP	Ophiuchidy N (2)	25 IV-31 V	10 V	049.7	249 (16.6 ^h)	-14	5	+0.9	-0.1	30	2.9		
CAU	β Corona Australidy (Koronidy) (2)	23 IV-30 V	15 V	054.7	284 (18.9 ^h)	-40	5	+0.9	-0.1	45	3.1	6	Drobne, białawe meteory
KSC	κ Skorpionidy (2)	4-27 V	19 V	058.9	267 (17.8 ^h)	-39	5	+0.9	0.0	45	2.8		
SOP	Południowe Ophiuchidy (2)	13-26 V	20 V	059.8	258 (17.2 ^h)	-24	5	+0.9	-0.1	30	2.9		
TAH	τ Herculidy	k. V-p. VI	31 V	069.5	209 (13.9 ^h)	+28				16	?	?	Strumień związany z kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3
OSC	ω Skorpionidy (2)	23 V-15 VI	4 VI	074.2	243 (16.2 ^h)	-22	5	+0.9	-0.1	23	3.0	7	Znane od starożytności (Grecja). Jasne, powolne żółto pomarańczowe meteory.
CSC	χ Skorpionidy (2)	24 V-20 VI	5 VI	075.2	248 (16.5 ^h)	-14	6	+0.9	-0.1	21	3.1		
GSA	γ Sagittarydy (2)	22 V-13 VI	6 VI	076.1	272 (18.1 ^h)	-28	6	+0.9	0.0	29	2.9		Powolne, żółtawe meteory
ARI	Dzienne Arietydy	14 V – 24 VI	7 VI	076.6	43 (2.9 ^h)	+24				38	2.8	30	Prawdopodobnie związane z planetoidą (1566) Icarus
TOP	θ Ophiuchidy (2)	4 VI-15 VII	13 VI	082.4	267 (17.8 ^h)	-20	5	+0.9	0.0	27	2.8		
JLY	Lirydy (czerwcowe)	11-21 VI	16 VI	085.2	278 (18.5 ^h)	+35	5	+0.8	0.0	31	3.0	5	
JBO	Bootydy (czerwcowe)	22VI - 2 VII	27 VI 11 ^h	095.7	224 (14.9 ^h)	+48	8	14	3.0	18	2.2	do 100	Nadzwyczaj powolne czerwone meteory. W latach 1916, 1922 obfite, w 1927 ZHR=300. Po 1933 osłabił, data widzialności przesunęła się. Związany z kometa 7P/Pons-Winnecke.
LSA	λ Sagittarydy (2)	5 VI-25 VII	1 VII	099.6	276 (18.4 ^h)	-25	6	+0.9	0.0	23	2.6		
JPE	Pegazydy (lipcowe)	4-14 VII	10 VII	108	347 (23.1 ^h)	+11	5	+0.8	+0.2	63	3.0	3	Jasne i szybkie białe meteory ze śladami. Związane z kometa C/1979 Y1 (Bradfield)
PHE	Fenicydy (VII)	10-16 VII	13 VII	111	32 (2.1 ^h)	-48	7	+1.0	+0.2	47	3.0	zm.	
PAU	Piscis Austrinidy	15 VII-10 VIII	28 VII	125	341 (22.7 ^h)	-30	5	+1.0	+0.2	35	3.2	5	
GDR	γ Drakonidy (lipcowe)	25 VII-31 VII	28 VII	125.1	280 (18.7 ^h)	+51				27	3.0	5	
SDA	Południowe δ Akwarydy	12 VII-23 VIII	31 VII	128	340 (22.7 ^h)	-16	5		4	41	2.5	25	Znany od starożytności. (Chiny, 714 r. p.n.e.) Jeden z najbogatszych strumieni nieba pld. Związane z kometa P/2008 Y12 (SOHO)
CAP	α Kaprikornidy	3 VII-15 VIII	31 VII	128	307 (20.5 ^h)	-10	8		4	23	2.5	5	Związane z kometa 169P/NEAT
SIA*	Południowe ι Akwarydy	25 VII-15 VIII	4 VIII	132	334 (22.3 ^h)	-15	5		4	34	2.9	2	
ERI	η Erydanidy	31 VII-19 VIII	7 VIII	135	41 (2.7 ^h)	-11				64	3.0	3	Związany z kometa C/1852K1 (Chacornac)

Oznac.	Nazwa strumienia	ΔT	T _{max}	λ [°]	Współrzędne radiantu		S [°]	ΔR [°/d]		v [km/s]	r	ZHR	Uwagi
					α [°]	δ [°]		αΔ	δΔ				
NDA*	Północne δ Akwarydy	15 VII-25 VIII	9 VIII	136	335 (22.3 ^h)	-5	5			42	3.4	4	
PER	Perseidy	17 VII-24 VIII	12 VIII	140.0	48 (3.2 ^h)	+58	5			59	2.2	100	Znany od starożytności Szybkie białe meteory ze śladami. Padają pęczkami po 6-15 meteorów w czasie 2-3 minut. W 1921 r. ZHR=400! Przesuwający się radiant. Związane z kometa 109P/Swift-Tuttle
KCG	κ Cygnidy	3-28 VIII	16 VIII	144	286 (19.1 ^h)	+59	6			23	3.0	3	Prawdopodobnie związane z planetoidą 2002 GJ8
NIA*	Północne ι Akwarydy	11-31 VIII	20 VIII	147	327 (21.8 ^h)	-6	5			31	3.2	3	
ERI	π Erydanidy	20 VIII-5 IX	29 VIII	155.7	52 (3.5 ^h)	-15	6	+0.8	+0.2	59	2.8		
AUR	Aurigidy	28 VIII-5 IX	1 IX 3 ^h	158.6	91 (6.1 ^h)	+39	5	+1.1	0.0	66	2.5	10	Związany z kometa C/1911 N1 (Kiess). Szybkie meteory ze śladami
SPE	ε Perseidy (wrześnieje)	5-21 IX	9 IX	166.7	48 (3.2 ^h)	+40	5	+1.0	+0.1	64	3.0	5	
SPI*	Piscydy	1-30 IX	20 IX	177	5 (0.3 ^h)	-1	8	+0.9	+0.2	26	3.0	3	Związany z kometa 1907 IV Morehouse. Powolne, jasne, czerwone meteory.
KAQ	κ Akwarydy	8 IX-30 IX	21 IX	178.7	339 (22.6 ^h)	-2	5	+1.0	+0.2	16	3.0	3	
DSX	Dzienne Sekstantydy	9 IX – 9 X	27 IX	184.3	156 (10.4 ^h)	-2				32	2.5	5	Związane z planetoidą (155140) 2005 UD
OCC	Kaprikornidy (październikowe)	20 IX-14 X	3 X	189.7	303 (20.2 ^h)	-10	5	+0.8	+0.2	15	2.8	3	
SOR	σ Orionidy	10 IX-26 X	5 X	191.7	86 (5.7 ^h)	-3	5	+1.2	0.0	65	3.0	3	
OCT	Camelopardalidy (październikowe)	5 - 6 X	5 X	192.6	164 (10.9 ^h)	+79				47	2.5	5?	
DRA	Drakonidy	6-10 X	8 X 19 ^h	195.4	263 (17.5 ^h)	+56	5			21	2.6	5?	Związany z kometa 21P/Giacobini-Zinner, znany już 15 lat przed jej odkryciem. Deszcze w latach 1926, 1933 (ZHR= 1000) i w 1946.
DAU	δ Aurigidy	10-18 X	11 X	198	84 (5.6 ^h)	+44				64	3.0	2	Związane z kometa C/1972 E1 (Bradfield)
EGE	ε Geminidy	14-27 X	18 X	205	102 (6.8h)	+27	5	+1.0	0.0	70	3.0	3	Związany z kometa C/1964 N1 (Ikeya)
ORI	Orionidy	2 X-7 XI	21 X	208	95 (6.3h)	+16	10	+1.2	+0.1	66	2.5	20+	Drugie spotkanie z meteorami związanymi z kometa 1P/Halley w zstępującym węźle jej orbity. Duży strumień białych meteorów ze śladami.
LMI	Leo Minorydy	19 -27 X	24 X	211	162 (10.8h)	+37				62	3.0	2	Związane z kometa C/1739 K1
STA*	Południowe Taurydy	20 IX-20 XI	5 XI	223	52 (3.5h)	+15	10/5			27	2.3	5-10	Znane od średniowiecza (Chiny, XI w.). Żółto-pomarańczowe powolne meteory. Są związane z kometa 2P/Encke. Powtórnie, wracając od Słońca, spotykają Ziemię w ciągu dnia w węźle zstępującym swojej orbity jako radiostrumień β Taurydy.

Oznaczn.	Nazwa strumienia	ΔT	T_{max}	λ [°]	Współrzędne radiantu		S [°]	ΔR [°/d]		v [km/s]	r	ZHR	Uwagi
					α [°]	δ [°]		$\alpha\Delta$	$\delta\Delta$				
NTA*	Północne Taurydy	20 X -10 XII	12 XI	230	58 (3.9 ^h)	+22	10/5			29	2.3	5	Związane z kometa 2P/Encke oraz z planetoidą 2004 TG10
LEO	Leonidy	6-30 XI	17 XI 18 ^h	235.3	152 (10.1 ^h)	+22	5	+0.7	-0.4	71	2.5	10-20	Znane od średniowiecza (Egipt, 899 r. n.e.). Bardzo szybkie meteory, zielonkawe ślady nawet u słabych. W 33 powrotach obserwowano 22 deszcze. W XX w. deszcze 1901 r. (Anglia), 1934 r. (Azja Śr.) i 17 XI 1966 r. (ZHR=140 tys.!, Płn. Arktyka, USA). Związane z kometa 55P/Tempel-Tuttle, o okresie 33.25 lat.
AMO	α Monocerotydy	15-25 XI	21 XI 23 ^h 30 ^m	239.3	117 (7.8 ^h)	+1	5	+1.1	-0.1	65	2.4	5, ale bywa 400	W 1925 i 1935 r. ZHR=100
NOO	Orionidy (listopadowe)	14 XI – 6 XII	28 XI	246	91 (6.1 ^h)	+16				41	3.0	3	
XOR*	χ Orionidy	26 XI-15 XII	2 XII	250	82 (5.5 ^h)	+23	8	+1.2	0.0	28	3.0	3	
PHO	Feniczydy (grudniowe)	1-5 XII	1 XII	249.5	8 (0.5 ^h)	-27	5	+0.8	+0.1	15	2.8	zmienny	Nieoczekiwany deszcz 5-6 XII 1956r. (ZHR=300). Białe meteory bez śladów. Związany prawdopodobnie z kometa 289P/Blanpain .
PUP	Puppidy-Velidy	1 -15 XII	(7 XII)	(255)	123 (8.2 ^h)	-45	5	+0.3	-0.1	44	2.9	10	
MON	Monocerotydy (grudniowe)	5-20 XII	9 XII	257	100 (6.7 ^h)	+8	5	+1.2	0.0	42	3.0	3	Związane z kometa D/1917 F1 (Mellish)
HYD	σ Hydrydy	3-20 XII	9 XII	257	125 (8.3 ^h)	+2	5	+0.7	-0.2	58	3.0	7	Związane z kometa C/2023 P1 (Nishimura)
GEM	Geminidy	4-17 XII	14 XII 8 ^h	262.2	112 (7.5 ^h)	+33	4	+1.0	-0.1	35	2.6	150	Najobfitszy strumień nieba płn. Białe meteory bez śladów. W ciągu 22 dni radiant przesuwają się o 27°. Związany z planetoidą (prawdopodobnie wygasłą kometa) 3200 Phaeton
COM	Coma Berenicydy	5 XII -4 II	16 XII	264	158 (10.5 ^h)	+30	5			64	3.0	3	Strumienie COM i DLM (Grudniowe Leo Minorydy) zostały w 2023 r. połączone w jeden rozciągnięty obszar pod oznaczeniem COM
URS	Ursydy	17-26 XII	22 XII 10 ^h	270.7	217 (14.5 ^h)	+76	5			33	2.8	10 (niekiedy 50)	Związany z kometa 8P/Tuttle. Pojawił się nieoczekiwanie 22 XII 1945 z ZHR=100. Okres obiegu komety 13.6 lat.
TPU	Tau-Puppidy (3)	19-30 XII	23 XII	272.0	104 (6.9 ^h)	-50	5	+0.2	-0.1	33	3.0		